

1.5kcal/ml

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
を参考にしております。

高濃度液状流動食

アイソカルサポート[®] ISOCAL[®] Support 1.5 Bag

全国の医療・
介護現場で
最も使用されている
流動食※

No.1

※ネスレ調べ 医療・介護現場へ販売された流動食(2021年)



総合栄養食品(病者用)
「糖質/食物繊維減量調整」
「マンガン増量調整」

消費者庁許可 総合栄養食品(病者用)取得



アイソカルサポート1.5Bagは**下痢・便秘症**に適するよう食物繊維
(グアーガム分解物等)を100mlあたり2.2g含有しています。

総合栄養食品において日本で初めて※1疾患名を表示※2

【許可表示】

アイソカルサポート1.5Bagは、食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した総合栄養食品で、疾患などにより通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な方に適しています。

※1 (ネスレ調べ) 消費者庁 特別用途食品 許可品目一覧(令和4年3月4日更新)に基づく

※2 「特別用途食品に関する質疑応答集(平成31年3月26日 消費表第105号)」を基にした表示に関して

300kcal/200ml

400kcal/267ml

500kcal/333ml



グアーガム分解物(PHGG)とは

グアーガム分解物(PHGG)はグアー豆から精製、酵素処理によってできる食物繊維です。PHGGは高発酵性食物繊維に分類されています。*

※暫定分類 日本食品分析センター news:No.34 Jul. 2003



栄養成分表					
アイソカルサポート® 1.5 Bagの量		100kcal (66.7ml)	300kcal (200ml)	400kcal (267ml)	500kcal (333ml)
熱量	kcal	100	300	400	500
たんぱく質	g	3.8	11.4	15.2	19.0
脂質	g	4.6	13.8	18.4	23.0
炭水化物	g	11.7	35.0	46.8	58.2
糖質	g	10.2	30.6	40.9	50.9
食物繊維	g	1.5	4.4	5.9	7.3
ナトリウム (食塩相当量)	mg (g)	90 (0.23)	270 (0.69)	360 (0.92)	450 (1.15)
水分	ml	51	153	204	255
ミネラル	カリウム	mg	80	240	320
	カルシウム	mg	75	225	300
	マグネシウム	mg	32	96	128
	リン	mg	80	240	320
	鉄	mg	1.0	3.0	4.0
	亜鉛	mg	1.3	3.9	5.2
	銅	mg	0.10	0.30	0.40
	マンガン	mg	0.40	1.20	1.60
	ヨウ素	μg	15.0	45.0	60.1
	セレン	μg	5.0	15.0	20.0
	クロム	μg	3.3	10.0	13.4
	モリブデン	μg	4.5	13.6	18.1
	塩素	mg	93	280	374
	ビタミンA	μgRAE	80	240	320
ビタミン	脂溶性	ビタミンD	μg	1.0	3.0
		ビタミンE	mg	0.9	2.7
		ビタミンK	μg	6.7	20
		ビタミンB ₁	mg	0.20	0.60
	水溶性	ビタミンB ₂	mg	0.23	0.70
		ナイアシン	mgNE※4	3.0	9.0
		ビタミンB ₆	mg	0.25	0.76
		ビタミンB ₁₂	μg	0.30	0.90
		葉酸	μg	25	75
		パントテン酸	mg	1.3	3.9
		ビオチン	μg	6.0	18.0
		ビタミンC	mg	20	60
				80	100

■:当社分析値(2021年6月現在) ※4:ナイアシン当量

主な原材料

デキストリン、カゼインカルシウム(乳成分を含む)、大豆油、グアーガム分解物、中鎖脂肪酸油、酵母調整品、食塩、食用油脂加工品/カゼインNa、リン酸塩(Mg、K)、クエン酸塩(Ca、Na)、乳化剤、塩化 K、V.C.、水酸化K、硫酸鉄、ナイアシン、安定剤(カラギーナン)、パントテン酸 Ca、V.E、V.B₆、V.B₁、V.B₂、V.A、葉酸、V.D、V.B₁₂

使用上の注意

- 医師、管理栄養士等のご指導に従って使用してください。
- 本品は栄養療法の素材として適するものであって、多く摂取することによって疾病が治癒するものではありません。
- 静脈内等へは絶対に注入しないでください。
- 開封前によく振ってください。
- 通常は温めずにそのまま使用してください。冷たい場合、室温に戻してください。
- 加熱する場合、未開栓のまま、お湯で温めてください。
- 容器のまま電子レンジで加熱しないでください。
- 容器の漏れや膨張がみられるものは使用しないでください。
- 開封時に異味、異臭や凝固のあるものは使用しないでください。
- 内容成分が浮遊、沈殿することがありますが、品質には問題ありません。
- 使用時には水分の過不足が生じ、水分調整が必要になる場合がありますので、必要に応じて医師・管理栄養士等にご相談ください。
- 本品のみで長期間の栄養管理を行う場合、ビタミン、微量元素、電解質(ナトリウム、カリウム、塩素など)のバランスにご注意ください。年齢、体重、使用量、使用期間によっては過不足場合がありますので、配合量を確認の上、医師・管理栄養士等にご相談ください。
- 本品は食物繊維を含むため、おなかの張りやガスなどが生じる場合があります。おなかの調子が気になった場合、必要に応じて医師・管理栄養士等にご相談ください。
- 果汁等の酸性物質や食塩、制酸剤等との混合は、たんぱく質が固まる原因となる場合があります。
- 開封後は速やかにご使用ください。
- 開封後に全量使用しない場合は、冷蔵庫に保管し、早めにご使用ください。
- 本容器は使い捨て(ディスポーザブル)です。
- 本容器は落下・衝撃等により破損しやすいため、保管取り扱いには十分ご注意ください。
- 開封時及び開封後に容器を強くつかむと内容液が飛び出しますので、容器と飲用口のつなぎ目の固い部分を持って扱ってください。
- 開封後のキャップは、栓として再利用できませんので廃棄してください。
- 容器の角で手や指等を傷つけないよう、ご注意ください。
- ジッパー開封後、逆さや横置きにすると内容液が漏れることがありますので、ご注意ください。また、ジッパーが完全に開まっているか、ご確認ください。
- 胃酸を抑制している場合、胃内で塊状の残留物が生じる場合があります。必要に応じて医師・管理栄養士等にご相談ください。
- 原材料に含まれるアレルゲン(28品目中):乳、大豆

取り扱い上の注意

- 室温で保存できますが、なるべく冷所に保管してください。



基礎数値

アイソカルサポート® 1.5 Bag (1.5kcal/ml)	200ml	267ml	333ml
エネルギー(kcal)	300	400	500
水分量(ml)	153	204	255
有効窒素量(g)	1.8	2.4	3.0
NPC/N※1	140		
必須アミノ酸/全アミノ酸	0.48		
Fischer比	2.9		
電解質(mEq/l)	Na ⁺ :59 K ⁺ :31 Ca ²⁺ :56 Mg ²⁺ :40 Cl ⁻ :39		
pH	6.7		
粘度(mPa・s※2)	47		
浸透圧(mOsm/l)※3	360		
乳糖(g)	0		

※1:計算式から算出し、整数1の位を四捨五入

※2:mPa・s(ミリパスカル秒)=cP

※3:浸透圧は2倍希釈にて測定

JANコード及び統一商品コード


	JANコード		統一商品コード
	製品	ケース	
200ml	4 987788 050921	4 987788 510609	788 510609
267ml	4 987788 050938	4 987788 510616	788 510616
333ml	4 987788 050945	4 987788 510623	788 510623

包装及び賞味期間

包装:200ml(300kcal)×18バッグ/ケース
267ml(400kcal)×18バッグ/ケース
333ml(500kcal)×18バッグ/ケース

賞味期間:製造日より6ヶ月

特別用途食品の分類図



「特別用途食品」として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受ける必要があります。表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性について、国の審査を受ける必要があります。

総合栄養食品とは

定められている栄養成分等の基準に適合し、疾病等により通常の食事摂取が不十分な者の食事代替品として、経口摂取又は経管利用できるよう液状又は半固形状で適度な流動性を有している食品です。

ネスレ日本株式会社
ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20
<https://www.nestlehealthscience.jp/>

2022年3月発行
®登録商標 A0641-01